



### ACCARTOCCIAMENTO FOGLIARE

L'accartocciamento è una malattia virale della vite che può provocare un ritardo nella maturazione dell'uva e, in certi casi, una diminuzione di produzione.

L'accartocciamento fogliare non va confuso con FD e LN anche se i sintomi sulla foglia possono trarre in inganno. In presenza di fitoplasmosi, infatti, il legno rimane verde e non c'è rigidità dei tralci; nel caso

dell'accartocciamento la maturazione dei tralci (agostamento) avviene regolarmente. In presenza di giallumi da fitoplasmi vi è una caduta ritardata delle foglie (filloptosi).

### Sintomi

Accartocciamento verso il basso dei bordi delle foglie dei ceppi colpiti. Antocianosi internervale su vitigni a bacca nera e ingiallimento, più o meno marcato, sui vitigni a bacca bianca.

Nell'autunno, le foglie dei ceppi più colpiti diventano bronzate, necrotizzano e cadono precocemente.



Tipico accartocciamento del lembo fogliare con nervature che rimangono verdi.



Sintomi su vitigno a bacca nera.

### Trasmissione


La malattia si diffonde attraverso il materiale vegetale di propagazione della vite. La trasmissione del virus può avvenire anche attraverso cocciniglie.

### Lotta

Non esiste un metodo di lotta curativa dopo l'infezione del ceppo.

La strategia di lotta contro l'accartocciamento si basa esclusivamente sull'utilizzo di materiale vegetale indenne da virus. Il materiale certificato è in grado di soddisfare questa esigenza.

Sono in corso degli studi per precisare le condizioni di sviluppo della malattia a livello della parcella ed il ruolo delle cocciniglie quale vettore. L'acquisizione di queste conoscenze complementari sono una premessa indispensabile prima di proporre, eventualmente, una nuova strategia di lotta contro le cocciniglie nell'ottica di contrastare l'estensione dell'accartocciamento della vite.



Confronto tra foglia sana (sx) e foglia malata (dx).