

**PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER INSTILLAZIONE ENDOVESICALE
DI SOSTANZE MEDICAMENTOSE (MITOMICINA C- EPIRUBICINA- BCG)**

Gentile Utente,

*per la cura e la profilassi delle recidive della neoplasia vescicale superficiale da cui Lei è affetto, è necessario eseguire un ciclo di chemioterapia topica mediante instillazioni endovesicali settimanali, per sei settimane consecutive, di **MITOMICINA C 40 mg./EPIRUBICINA/ BCG** da effettuarsi in regime ambulatoriale. Alla prima seduta dovrà presentarsi, all'ora prescritta, presso i nostri ambulatori munito di tessera sanitaria e di impegnativa medica.*

PRIMA DELLA PROCEDURA

- *Tre ore prima della procedura è necessaria l'assunzione orale di 1 bustina di Monuril; in caso di bruciori durante l'espulsione dell'urina (dopo la procedura), assumere un'altra bustina di Monuril a 24 ore dalla prima assunzione.*
- *È opportuno ridurre l'assunzione di liquidi sin dalla sera precedente l'instillazione.*
- Solo nel caso di instillazione di **BCG**, nelle quattro ore precedenti, evitare di assumere cibi e bevande con caffeina (caffè, the, cioccolato, alcolici, coca-cola) perché possono irritare la vescica.

DURANTE LA PROCEDURA

- Il farmaco chemioterapico verrà introdotto in vescica mediante cateterismo transuretrale.
- Eseguita l'instillazione, è necessaria la permanenza del farmaco in vescica per almeno un'ora.

DOPO LA PROCEDURA

- Alla prima minzione dopo l'instillazione, è bene sedersi sul WC per evitare di schizzare urina.
- Dopo la minzione, lavarsi accuratamente le mani e l'area genitale dopo aver urinato. Questo l'aiuterà ad evitare l'irritazione della cute che il farmaco può provocare.
- Per le prime 5/6 ore dopo il trattamento, solo nel caso di instillazione di **BCG** è utile versare una tazza di candeggina nel WC dopo aver urinato, lasciare agire per 15 minuti prima di azionare lo sciacquone.
- Nei due giorni successivi l'instillazione endovesicale, è opportuno bere abbondantemente (almeno due litri al giorno).
- Solo nel caso di instillazione di **BCG** è utile astenersi dai rapporti sessuali non protetti per la prima settimana.
- Nelle quarantotto ore successive l'instillazione, potrebbero comparire sangue nelle urine, bruciori alla minzione, aumentata frequenza minzionale, febbre (37,5°), malessere generale, quali normali conseguenze dell'instillazione stessa.



DIPARTIMENTO CHIRURGICO
Responsabile Dr. Roberto Busolin

U.F. UROLOGIA
Responsabile Dr. Carmelo Morana
Te. 0422 896722

MOD-CH18
Rev. 06-09/10/18
Pagina 2 di 2

**PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER INSTILLAZIONE ENDOVESCICALE
DI SOSTANZE MEDICAMENTOSE (MITOMICINA C- EPIRUBICINA- BCG)**

IN CASO DI NECESSITÀ

- Qualora i suddetti disturbi fossero particolarmente intensi e/o prolungati, potrà contattare, previa consultazione del suo medico curante, i nostri ambulatori al n. telefonico **0422 896562** dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
- In orari diversi da quelli sopracitati, il sabato e i giorni festivi, chiamare al numero **0422 896722** (Reparto).

CONTROLLI SUCCESSIVI

Al termine del ciclo di chemioterapia endovescicale:

- **se eseguita con BCG**, sarà programmata una cistoscopia di controllo con biopsia (TURV bioptica) in sala operatoria, almeno dopo un mese dall'ultima instillazione;
- **se eseguita con mitomicina/ epirubicina** sarà programmata una cistoscopia in regime ambulatoriale, almeno dopo 4 mesi dall'ultima instillazione;
- trascorsi almeno 25 giorni dall'ultima instillazione vescicale, **dovrà eseguire la citologia urinaria su tre campioni** (previa impegnativa del medico curante).

Tale schema potrà subire eventuali variazioni a giudizio del medico curante.

IMPORTANTE!

Portare con sé tutta la documentazione sanitaria (impegnativa, referti, radiografie, ECG, ecc.)

Eventuali rinunce o spostamenti devono essere comunicati all'Ufficio Prenotazioni:
0422 8961 dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì